



ŻEL WYBIELAJĄCY OPALESCENCE - INSTRUKCJA DLA PACJENTÓW

ŻEL WYBIELAJĄCY OPALESCENCE INSTRUKCJA DLA PACJENTA

- Starannie wyszczotkować zęby używając pasty do zębów. Zdjąć zatyczkę z aplikatora strzykawki.
- Wycisnąć żel ze strzykawki równomiernie do najgłębszych i zewnętrznych części nakładki; z reguły zużywa się połowę zawartości strzykawki.
- Nałożyć nakładkę szczelnie na zęby, lekko docisnąć nakładkę tak aby żel dokładnie przylegał do zębów.
- Przy pomocy szczoteczki do zębów lub czystego palca usunąć nadmiar żelu wypływający poza nakładkę.
- Nakładkę z żelem można nakładać w nocy lub w ciągu dnia.
- Po upływie zaleconego przez lekarza stomatologa czasu zdjąć nakładkę i usunąć resztki żelu z nakładki.
- Nakładkę powinno się zdejmować do jedzenia lub picia, nie należy palić podczas noszenia nakładki.

Uwaga! Zbyt mocne dociśnięcie nakładki spowoduje wypłynięcie zbyt dużej ilości żelu poza nakładkę i pogorszenie efektu kuracji.

UWAGA! Nie połykać resztek żelu!

UWAGA! Nie wolno:

1. Stosować Opalescence u kobiet w ciąży i w czasie karmienia piersią.
2. Jeść podczas noszenia nakładki.
3. Używać wyrobów tytoniowych (np. papierosy "itp.") z założoną nakładką.
4. Wystawiać strzykawek z żelem Opalescence na działanie promieni słonecznych lub wysokiej temperatury.
5. Zamrażać strzykawek z żelem.

Uwaga!

1. Kolor zębów wzdłuż linii dziąseł (szyjki zębów) jest z reguły ciemniejszy. Te części zęba mogą wymagać dłuższego wybielania niż pozostałe i mogą pozostać lekko ciemniejsze po zakończeniu kuracji.
2. Niewielki odsetek pacjentów może odczuwać nadwrażliwość podczas kuracji. W przypadku pojawienia się dolegliwości należy skontaktować się z prowadzącym lekarzem stomatologiem. Może on zalecić używanie Opalescence co drugą lub co trzecią noc lub stosowanie nakładki na jedną do trzech godzin w ciągu dnia.
3. Kwaśne produkty lub soki (np. z owoców cytrusowych) mogą powodować nadwrażliwość zębów.
4. Niektórzy pacjenci podczas kuracji mogą skarżyć się na dolegliwości dziąseł, warg , gardła lub języka. Jeżeli trwają one dłużej niż dwa dni lub zwiększają się należy skontaktować się z prowadzącym lekarzem stomatologiem. Z reguły efekty uboczne ustępują po jednym do trzech dni po zakończeniu kuracji.
5. Kawa, tytoń i inne produkty mogą z czasem spowodować ponowne powstanie ciemnego zabarwienia zębów. W takim przypadku należy powtórzyć kurację preparatem Opalescence.
6. Dla zachowania pięknego białego uśmiechu należy regularnie zgłaszać się na badania kontrolne i ewentualne profesjonalne oczyszczanie zębów.

7. Jeżeli pojawiają się pytania dotyczące kuracji należy skontaktować się z prowadzącym lekarzem stomatologiem.
8. Niektóre stare wypełnienia amalgamatowe „srebrne plomby” mogą powodować powstanie purpurowego zabarwienia na nakładce. Jest to normalnym zjawiskiem i nie wpływa na przebieg kuracji.
9. Po zakończeniu kuracji należy wyrzucić pozostały, nie zużyty żel.